

**FERTILIZANTE ORGANO-MINERAL | Regulador floración y amarre de fruto**
Suspensión acuosa**DESCRIPCIÓN:**

SUMMA Ca+B+Zn es un fertilizante de alta asimilación que ayuda al incremento de la floración y amarre de fruto.

El calcio (Ca) es un cofactor de enzimas y el boro (B) es esencial en el desarrollo de meristemas, ambos intervienen en la división celular generando una correcta maduración del fruto. El zinc (Zn) participa en la formación de clorofila, favoreciendo la síntesis de auxinas, lo cual mejora los rendimientos, calidad y duración del fruto.

Los ácidos orgánicos y las oligosacarinas de **SUMMA Ca+B+Zn** estimulan los procesos metabólicos para el crecimiento de tallos, hojas, flores y frutos.

BENEFICIOS:

- ✓ Incrementa la floración y amarre de fruto.
- ✓ Correcta formación del fruto.
- ✓ Evita caída de frutos jóvenes, necrosis, acorchado, pudriciones apicales y rajado de frutos.
- ✓ Disminuye pérdidas por rechazo de frutos.
- ✓ Rápida asimilación en la planta.
- ✓ Es de fácil manejo y aplicación.
- ✓ Ambientalmente seguro.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Calcio (CaO)	8.0%
Boro (B)	1.0%
Zinc (Zn)	1.0%
Oligosacarinas	3000 ppm
Ácidos orgánicos	3.0%

INCOMPATIBILIDAD:

No mezclar **Summa CaBZn** con productos de fuerte reacción alcalina.

RECOMENDACIONES DE USO:

Destape con cuidado el envase, mida la cantidad indicada de **Summa CaBZn** y realice una premezcla en un recipiente con agua, para posteriormente vaciarla al tanque de mezcla agitando constantemente.

Aplicar **Summa CaBZn** vía foliar, cubriendo la mayor parte del follaje y los frutos de la planta.

No aplicar con altas temperaturas, ni cuando exista alta velocidad del viento o amenaza de lluvia.

CULTIVOS**RECOMENDACIONES**

Agave, Ajo, Alcachofa, Arándano, Berenjena, Brócoli, Calabaza, Cebolla, Chile, Col, Coliflor, Ejote, Espárrago, Frambuesa, Fresa, Lechuga, Melón, Papa, Papayo, Pepino, Pimiento, Rábano, Sandía, Tomate, Vid, Zanahoria, Zorzamora

Aplicar de 1 a 2 L/ha al inicio de la floración y hasta la cosecha con intervalos de 2 a 4 semanas.

Aguacate, Algodón, Banano, Café, Cítricos, Durazno, Guayabo, Higo, Mango, Manzano, Nogal, Ornamentales, Peral, Piña

Aplicar de 2 a 3 L/ha al inicio de la floración y hasta la cosecha con intervalos de 2 a 4 semanas.

“La información contenida en esta Ficha Técnica, se proporciona con buenas intenciones, pero no constituye una garantía o compromiso de responsabilidad”

