

**FERTILIZANTE ORGANO-MINERAL | Regulador para poscosecha**

Suspensión acuosa

DESCRIPCIÓN:

Summa Protect es un fertilizante de alta asimilación que favorece la estructura celular.

El calcio (Ca) y boro (B) son cofactores de enzimas que ayuda a producir frutos de alto valor económico por sus características organolépticas (firmeza, color, sabor, brillo); genera larga vida de anaquel y baja incidencia de enfermedades de poscosecha.

Los ácidos orgánicos y las oligosacarinas de **Summa Protect** promueven la síntesis de fibras que mantienen las uniones celulares, favoreciendo la traslocación del calcio y silicio para fortalecer las paredes celulares del tejido vegetal.

BENEFICIOS:

- ✓ Mayor vida de anaquel.
- ✓ Enaltece las características organolépticas.
- ✓ Rápida asimilación en la planta.
- ✓ Es de fácil manejo y aplicación.
- ✓ Ambientalmente seguro.

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Calcio (CaO)	9.0%
Boro (B)	3.0%
Ácido monosilícico	1.0%
Oligosacarinas	3000 ppm
Ácidos orgánicos	3.0%

INCOMPATIBILIDAD:

No mezclar **Summa Protect** con productos de fuerte reacción alcalina.

RECOMENDACIONES DE USO:

Destape con cuidado el envase, mida la cantidad indicada de **Summa Protect** y realice una premezcla en un recipiente con agua, para posteriormente vaciarla al tanque de mezcla agitando constantemente.

Aplicar **Summa Protect** vía foliar, cubriendo la mayor parte del follaje y los frutos de la planta.

No aplicar con altas temperaturas, ni cuando exista alta velocidad del viento o amenaza de lluvia.

CULTIVOS**RECOMENDACIONES**

Agave, Ajo, Alcachofa, Arándano, Berenjena, Brócoli, Calabaza, Cebolla, Chile, Col, Coliflor, Ejote, Espárrago, Frambuesa, Fresa, Lechuga, Melón, Papa, Papayo, Pepino, Pimiento, Rábano, Sandía, Tomate, Vid, Zanahoria, Zorzamora

Aplicar de 1 a 2 L/ha durante el periodo de llenado de frutos, tubérculos o bulbos y hasta la cosecha con intervalos de 2 semanas.

Aguacate, Algodón, Banano, Café, Cítricos, Durazno, Guayabo, Higo, Mango, Manzano, Nogal, Ornamentales, Peral, Piña

Aplicar de 2 a 3 L/ha durante el periodo de llenado de frutos y hasta la cosecha intervalos de 2 a 4 semanas.

“La información contenida en esta Ficha Técnica, se proporciona con buenas intenciones, pero no constituye una garantía o compromiso de responsabilidad”

