

# TROODON

BIOESTIMULANTES

## REGULADOR DE CRECIMIENTO TIPO 1 | Enraizador

Suspensión acuosa

### DESCRIPCIÓN:

**Troodon** es un bioestimulante de crecimiento radicular que combina fitohormonas, ácidos orgánicos, macronutrientes y zinc, lo cual promueve la emisión, el desarrollo, una buena ramificación y vigorización de nuevas raíces por periodos prolongados.

Los ácidos orgánicos de **Troodon** favorecen al movimiento de las fitohormonas hacia el centro quiescente lo que favorece la diferenciación celular generando nuevas raíces.

### BENEFICIOS:

- ✓ Promueve la generación de nuevas raíces.
- ✓ Genera una mayor tasa de crecimiento en raíces ya establecidas.
- ✓ Facilita el rápido establecimiento del cultivo después del trasplante o siembra.
- ✓ Mejora el aprovechamiento del agua y de los nutrientes.
- ✓ Es de fácil manejo y aplicación.
- ✓ Ambientalmente seguro.

### COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Ácido indolbutírico	2500 ppm
Ácido indolacético	500 ppm
Nitrógeno (N <sub>2</sub> )	5.0%
Fosforo	15.0%
Zinc	1.0%
Ácidos orgánicos	5.0%

### INCOMPATIBILIDAD:

No mezclar **Troodon** con productos de fuerte reacción alcalina.

### RECOMENDACIONES DE USO:

Destape con cuidado el envase, mida la cantidad indicada de **Troodon** y realice una premezcla en un recipiente con agua, para posteriormente vaciarla al tanque de mezcla agitando constantemente.

Aplicar **Troodon** vía riego presurizado dirigido, drench o con aspersor de mochila, cubriendo la zona de la raíz de la planta.

### CULTIVOS

Ajo, Alcachofa, Arándano, Berenjena, Brócoli, Calabaza, Cebolla, Chile, Col, Coliflor, Ejote, Espárrago, Frambuesa, Fresa, Lechuga, Melón, Papa, Papayo, Pepino, Pimiento, Rábano, Sandía, Tomate, Vid, Zanahoria, Zorzamora

Agave, Aguacate, Algodón, Banano, Café, Cítricos, Durazno, Guayabo, Higo, Mango, Manzano, Ornamentales, Nogal, Peral, Piña

### RECOMENDACIONES

Aplicar de 1 a 2 L/ha a la siembra, trasplante o inicio del ciclo.

También aplicar cuando se observe restricción del desarrollo radicular, prefiriendo la dosis alta cuando se requiera respuesta inmediata.

Aplicar de 3 a 4 L/ha a la siembra, trasplante o inicio del ciclo.

También aplicar cuando se observe restricción del desarrollo radicular, prefiriendo la dosis alta cuando se requiera respuesta inmediata.

“La información contenida en esta Ficha Técnica, se proporciona con buenas intenciones, pero no constituye una garantía o compromiso de responsabilidad”